

## **Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Pencarian Pengobatan Balita Diare di Labuan Kabupaten Pandeglang 2014**

Zulaeha, Ratna

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=107823&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Penyakit diare merupakan masalah kesehatan, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. SPM Kabupaten Pandeglang 2014 sebesar 90%. Balita yang menerima perawatan dari fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan angka tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanganan diare pada Balita sebesar 100%.<div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div>Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek pencarian pengobatan Balita diare di wilayah kerja Puskesmas Labuan. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi adalah Balita yang didiagnosa diare selama Januari - April 2014 di klinik MTBS Puskesmas Labuan dan sampel berjumlah 100 Balita. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner.<div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div>Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara umur Balita dengan praktek pencarian pengobatan  $p = 0.023$  dan nilai  $OR = 2.95$ . Diharapkan kepada pihak Puskesmas Labuan untuk meningkatkan promosi kesehatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit diare pada Balita sehingga dapat berpengaruh pada perubahan perilaku pencarian pengobatan diare pada Balita.<div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div><hr /><div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div><em><em>Diarrheal disease is a public health problem because the morbidity and mortality are still high. Standart Minimal Services Pandeglang 2014 is 90% of Toddlers who receive care from a health facility or health worker that number does not meet the Standart Minimal Services treatment of diarrhea in children under five by 100%.</em></em><div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div><em><em>This study to determine the factors associated with treatment seeking practice of diarrhea in children under five at Puskesmas Labuan. Quantitative research with cross sectional design. The population were diagnosed Toddler with diarrhea during January-April 2014 in the clinic Labuan MTBS health center and totaled 100 Toddler. Data obtained from interviews using questionnaire.</em></em><div style="margin-bottom: 6px;">&nbsp;</div><em>The results of the bivariate analysis showed no significant relationship between age Toddlers with treatment of diarrhea in seeking  $p = 0.023$  and  $OR = 2.95$ . Labuan is expected to do health promotion programs to improve the prevention and control of diarrheal diseases in Toddlers that can affect the health seeking behavior of diarrhea in toddler.</em>