

Determinan pemanfaat pelayanan antenatal di provinsi Aceh: analisi data riskesdas tahun 2013

Murhaban

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=126034&lokasi=lokal>

Abstrak

Kematian ibu di negara berkembang masih tinggi, selain faktor medis faktor pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Cakupan pelayanan antenatal (K4) di Provinsi Aceh masih di bawah target Nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan antenatal dan menganalisis determinan yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, fokus pada wanita yang pernah hamil selama 3 tahun terakhir sebelum survei, dengan jumlah sampel adalah 2.081 responden. Metode analisis menggunakan model regresi logistik, untuk memprediksi faktor penentu pemanfaatan pelayanan antenatal. Hasil menunjukkan 66,12% ibu hamil memanfaatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar waktu yang ideal. Faktor-faktor yang secara konsisten dan positif berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal (K4) adalah status ekonomi, kepemilikan buku KIA, keinginan hamil, umur, dan pendidikan. faktor komplikasi kehamilan cenderung berhubungan positif apabila standar pelayanan antenatal (K4) yang digunakan tidak ditentukan waktu pemeriksaan. Kata kunci: Kematian Ibu, Pelayanan Antenatal, Regresi Logistik, Aceh.

Maternal mortality in developing countries is still high, in addition to medical factors, factors of maternal health services is of the causes of maternal death. Coverage of antenatal care (K4) in the province of Aceh still below national targets. The purpose of research to describe and analyze the utilization of antenatal care determinants related to the utilization of antenatal care in the province. This study uses data from Riskesdas In 2013, focusing on women who have been pregnant for 3 years prior was to the survey, with a sample size is 2,081 respondents. The method of analysis using logistic regression model, which was useful for predicting the determinants of the utilization of antenatal care. Results showed that 66.12% of pregnant women utilize antenatal care at least 4 times the corresponding standard ideal time. Factors that consistently and positively associated with utilization of antenatal care (K4) is the economic status, maternal and child health handbook, pregnant wishes, age, and education. pregnancy complications factors tend to be associated positively if the standard antenatal care (K4) used an unspecified time of the examination. Keywords: Maternal Mortality, Antenatal Care, Logistic Regression, Aceh.