

Determinan Faktor Status Gizi Normal (Penyimpangan Positif) Pada Anak Baduta Dari Keluarga Termiskin

Entos

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=126576&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyimpangan positif positive deviants yang berhubungan dengan status gizi normal tidak stunting dan tidak wasting pada anak usia baduta dari keluarga termiskin, dengan pendekatan penyimpangan positif positive deviance . Penelitian ini menggunakan data Riskesdas tahun 2010 dari Kementerian Kesehatan RI, dengan sampel anak usia 0-11 bulan dan 12-23 bulan dari keluarga termiskin yaitu dengan pengeluaran perkapita per bulan pada 10 terendah atau maksimal < Rp 176.009.-. Status gizi didasarkan kepada TB/U untuk menentukan status gizi normal dan stunting pendek dan BB/TB untuk menentukan status gizi normal dan wasting kurus . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyimpangan positif positive deviants yang berhubungan dengan status gizi normal pada anak usia 0-11 bulan dari keluarga termiskin adalah : 1 pemberian ASI dengan frekuensi > 8 kali sehari; status gizi normal bayi diberikan ASI > 8 kali sehari 68,0 , dan < 8 kali sehari 53,0 $p = 0,03$ < 0,05 OR 1,88 1,09 ndash; 3,25 , dan 2 penimbangan berat badan di Posyandu setiap bulan; status gizi normal bayi ditimbang setiap bulan di Posyandu 66,7 , dan tidak setiap bulan 52,9 $p = 0,05$ = 0,05 OR 1,78 1,03 ndash; 3,10 . Faktor penyimpangan positif positive deviants yang berhubungan dengan status gizi normal pada anak usia 12-23 bulan dari keluarga termiskin adalah : 1 tingkat konsumsi energi > 70 AKG; status gizi normal konsumsi energi > 70 AKG 57,6 , < 70 AKG 39,8 $p = 0,014$ < 0,05 , OR 2,05 1,19 ndash; 3,54 , 2 kepemilikan sarana Buang Air Besar BAB ; status gizi normal keluarga yang memiliki sarana BAB 48,4 , tidak memiliki 33,3 $p = 0,01$ < 0,05 , OR 1,88 1,17 ndash; 3,02 , 3 kualitas fisik air minum kategori layak; status gizi normal pada keluarga termiskin yang memiliki kualitas fisik air minum kategori layak 46,3 , tidak layak 30 $p = 0,03$ < 0,05 OR 2,01 1,10 ndash; 3,67 , dan 4 riwayat sakit anak saat neonatal; status gizi normal pada anak tidak pernah sakit saat neonatal 66,0 , anak pernah sakit 47,5 $p = 0,03$ < 0,05 OR 2,14 1,10 ndash; 4,18 . Kata kunci: Status Gizi Normal, Penyimpangan Positif Positive Deviants , Keluarga Termiskin.