

Gambaran Perilaku Pencarian Pengobatan Tuberkulosis Pada Orang Dengan Gejala Batuk 14 Hari atau Lebih atau Batuk Berdarah di Indonesia (Analisis Data Survei Prevalensi Tuberkulosis 2013-2014

Silitonga, Permata Imani Ima

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=131248&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku pencarian pengobatan pada orang dengan gejala tuberkulosis 14 hari atau lebih batuk atau batuk berdarah di Indonesia berdasarkan faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor kebutuhan. Pada penelitian ini, desain studi yang digunakan adalah studi cross sectional menggunakan data sekunder dari survei prevalensi tuberkulosis 2013-2014 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan analisis univariat dan bivariat. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang ditemukan bahwa perilaku pencarian pengobatan pada orang dengan gejala TB lebih besar di non fasyankes (75,4%) dibandingkan dengan perilaku pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan (24,6%). Gambaran perilaku pencarian pengobatan ke non fasyankes pada orang dengan gejala TB lebih banyak pada usia <46 tahun (77,2%), jenis kelamin laki-laki (80,1%), memiliki tingkat pendidikan rendah (75,7%), memiliki pengetahuan rendah (76,1%), memiliki perilaku merokok (82,9%), tidak memiliki stigma (76,2%), berada di perkotaan (75,6%), tidak mengetahui bahwa OAT gratis (76,5%), tidak memiliki faktor risiko DM (75,6%), tidak tinggal dengan penderita TB (75,7%) dan tidak memiliki pengetahuan TB bisa disembuhkan (76,4%).