

## **Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas buatan II Siak tahun 2007**

Nurpelita

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=53169&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Untuk mendapatkan gizi yang baik pada bayi yang baru lahir, ibu harus sesegera mungkin menyusui bayinya karena ASI sangat berperan penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi. Oleh karena itu, bayi yang berumur 0-6 bulan dianjurkan hanya diberi ASI tanpa pengganti ASI maupun makanan pendamping. Berdasarkan laporan profil kesehatan Kab. Siak target pencapaian pemberian ASI eksklusif 45,2% pada tahun 2005. Mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, maka perludanya usaha yang keras melalui penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas buatan II kab. Siak tahun 2007. Adapun rancangan penelitian adalah cross sectional pada 109 ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas Buatan II kab. Siak tahun 2007. Dari hasil penelitian ini diketahui proporsi ibu yang memberikan ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Buatan II cakupannya masih rendah yaitu: 17.4 %. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif adalah pendidikan, sikap, kemampuan petugas, dukungan petugas ( $p < 0,05$ ). Sedangkan faktor umur, pengetahuan, pekerjaan, fasilitas kesehatan dan dukungan keluarga tidak berhubungan secara signifikan dengan pemberian ASI eksklusif ( $p > 0,05$ ). Tidak ada hubungan interaksi antara variabel pendidikan dengan sikap dan kemampuan petugas dengan dukungan petugas. Ibu yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang 4,557 kali untuk menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang mempunyai pendidikan rendah. Ibu yang mempunyai sikap positif mempunyai peluang 5,101 kali menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang mempunyai sikap negatif. Ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kemampuan petugas yang baik mempunyai peluang 6,974 kali menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kemampuan petugas yang kurang. Ibu yang mendapatkan dukungan petugas kesehatan mempunyai peluang 5,333 kali menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang kurang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan.

To provide good nutrition for a new born baby, the mother should as soon as possible breast-feed her baby as breast milk is very important to save the life of the baby. That's the reason why babies between the ages of 0 - 6 months are encouraged to be breast-fed without any additional mother's milk replacement or food supplement. Based on the report from Siak regency health profile, achievement target for exclusive breast-feeding is 45.2 % in 2005. Knowing the importance of exclusive breast-feeding in improving human resources quality, it's imperative to work even harder through counseling to the public. The goal of the research is to uncover the predisposition factors, supporting factors and encouraging factors related to the exclusive breast-feeding in the working district of "puskesmas buatan II, Siak regency in 2007. While the research itself is designed by cross sectional to 109 mothers who breast-feed in the working district of "Puskesmas Buatan II" siak regency in 2007. The result of this research is the knowledge that the percentage of mothers who breast-fed their babies exclusively in working district of "Puskesmas buatan II"; was still very low which was: 17.4%. Factors that affected the exclusive

breast-feeding is the variable of education, attitude, staff skill staff support ( $p > 0.05$ ). While factors such as age, knowledge, job, health facility and family support has no significant relation with exclusive breast-feeding. There's no inter-act relation between the variable of education with attitude, and between quality of the staff and its support. The opportunity for mothers who have higher education In breast-feed their babies exclusively is 4.557 times more than mothers with lower education. The opportunity for mothers who have positive attitude to breast-feed their babies exclusively is 5.101 times more than mothers with negative attitude. Opportunity for mothers who get health service from a better quality health institution staff are 6.974 times more likely to breast-feed their babies than mothers who get health service from a poor quality of health institution staff Mothers who get support from the health institution staff have the opportunity to breast-feed 5.333 times more than mothers who don't have support from the health institution staff.